

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO

KENSHI

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN

Polvo Mojable - (WP)

Composición:

- Imidacloprid: 420 g/kg
- Lambda-Cyhalothrin: 60 g/kg

ACCIÓN FITOSANITARIA

KENSHI es un insecticida mixto del grupo de los neonicotinoides + piretroide para el control de plagas trozadoras

MODO DE ACCIÓN

KENSHI actúa por contacto e ingestión (estomacal), con una buena acción translaminar y residual, con efecto de choque y persistencia.

MECANISMO DE ACCIÓN

Imidacloprid: Su mecanismo de acción se basa en la interferencia de la transmisión de los estímulos nerviosos de los insectos. Ataca a la proteína receptora y no se desdobla como en el caso de la acetilcolina.

Lambda-Cyhalotrin: Interfiere en el sistema nervioso del insecto, perturba la función de las neuronas por la interacción del canal de sodio

DOSIS GENERAL

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Maíz	<i>Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda)</i>	150g/ha
Arroz	<i>Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda)</i>	
Papa	<i>Gusano Blanco (Premnotrypes vorax)</i>	600g/ha
Papa	<i>Paratrioza (Bactericera cockerelli)</i>	500g/ha
Rosas	<i>Thrips (Frankliniella occidentalis)</i>	750g/ha
Cacao	<i>Pulgon de cacao (Toxoptera aurantií)</i>	120g/ha

COMPATIBILIDAD

El producto es compatible con la mayoría de plaguicidas usados en la agricultura, no es compatible con productos ácidos, alcalinos y agentes oxidantes

TOXICIDAD

Categoría III - franja azul - LIGERAMENTE PELIGROSO



CUIDADO



PERÍODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada luego de 24 horas

PERÍODO DE CARENIA

Arroz	14 días
Maíz	30 días
Rosa	No aplica
Papa	21 días
Cacao	30 días

REGISTRO

151- I2/NA

FABRICADO Y FORMULADO POR



NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.

IMPORTADO POR

