

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO

LORFOS WG

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN

Gránulos Dispersables (WG)

Composición:

- Emamectin benzoate: 100 g/kg
- Lufenuron: 400 g/kg

ACCIÓN FITOSANITARIA

Insecticida de acción por contacto e ingestión para control de larvas y estados juveniles de insectos plaga en cultivos agrícolas

MODO DE ACCIÓN

Lorfos es un insecticida de acción estomacal y de contacto, para aplicaciones foliares como al suelo.

MECANISMO DE ACCIÓN

Emamectin benzoato: Un insecticida de la familia de las avermectinas que bloquea el impulso nervioso en las larvas, causando parálisis, inactividad alimentaria y muerte.

Lufenuron: Es un regulador del crecimiento (IGR) de los insectos, que interfiere con la síntesis de la quitina, inhibiendo el proceso de muda y crecimiento de larvas causando su muerte.

DOSIS GENERAL

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Maíz	Cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	50 gramos / hectárea

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas, se recomienda hacer una prueba a pequeña escala. No mezclar con ácidos fuertes, alcalinos u oxidantes.

TOXICIDAD

Categoría 4 - franja azul – LIGERAMENTE PELIGROSO



PERÍODO DE REINGRESO

Esperar un mínimo de 24 horas para ingresar al área tratada

PERÍODO DE CARENCIA

Maíz 35 días

REGISTRO

195-I3/NA

FABRICADO Y FORMULADO POR


Nanjing Landscape Agrosience Ltd.

IMPORTADO POR


Productividad responsable