

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO

YOGA / BLACKMECTIN

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN

Emulsión Concentrada (EC) que contiene Abamectina 18 gramos por litro de producto formulado

ACCIÓN FITOSANITARIA

Insecticida – Acaricida eficaz para el control de insectos minadores y ácaros

MODO DE ACCIÓN

Insecticida y acaricida con acción de contacto y estomacal. Tiene actividad sistémica limitada en la planta, pero presenta movimiento translaminar

MECANISMO DE ACCIÓN

Actúa estimulando la liberación de ácido –amino-butírico, que es un inhibidor neuro transmisor lo que ocasiona la parálisis general del insecto

DOSIS GENERAL

	CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
	ROSAS	Ácaros (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.4 ml / l
	PAPAYA	Ácaros (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	0.4 ml / l
	FREJOL, ARVEJA, CAUPI, CHOCHO, GARBANZO, HABA, LENTEJA, TAMARINDO, GUABA	Ácaros (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.4 ml / l

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola, se recomienda hacer una prueba a pequeña escala

TOXICIDAD

Categoría II franja amarilla – Moderadamente Peligroso
DL50 oral aguda para las ratas 308 mg / kg.
LD50 dérmica aguda para las ratas 1578 mg / kg.
CL50 por inhalación aguda (4 h) para las ratas > 2,03 mg / l

PERÍODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada luego de 24 horas

PERÍODO DE CARENCIA

14 días en Fréjol, Caupi, Chocho, Garbanzo, Haba, Lenteja. En rosas no aplica.

REGISTRO

13-AI2/NA

FABRICADO POR



NINGBO SUNJOY AGRSCIENCE CO., LTD.
21 Jiangxia St., Ningbo 315000
Tel: (86-574-87348569), Fax: 86-574-87356775, CHINA

IMPORTADO POR



Dirección: Avenida de las
Américas y Los Naranjos
Teléfono: 593-7-2816150, 886772
Cuenca - Ecuador