

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO

KENSHI WP

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN

Polvo Mojable - (WP) que contiene 420 gramos de Imidacloprid + 60 g de Lambda-Cyhalothrin por kilo de producto formulado

ACCIÓN FITOSANITARIA

KENSHI es un insecticida mixto del grupo de los neonicotinoides + piretroide para el control de plagas trozadoras

MODO DE ACCIÓN

KENSHI actúa por contacto e ingestión (estomacal), con una buena acción translaminar y residual, con efecto de choque y persistencia.

MECANISMO DE ACCIÓN

Imidacloprid: Su mecanismo de acción se basa en la interferencia de la transmisión de los estímulos nerviosos de los insectos. Ataca a la proteína receptora y no se desdobla como en el caso de la acetilcolina.

Lambda-Cyhalotrin: Interfiere en el sistema nervioso del insecto, perturba la función de las neuronas por la interacción del canal de sodio

DOSIS GENERAL

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Maíz	<i>Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda)</i>	0.15kg/ha
Arroz	<i>Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda)</i>	
Papa	<i>Gusano Blanco (Premnotrypes vorax)</i>	0.60kg/ha
Papa	<i>Paratrioza (Bactericera cockerelli)</i>	0.50kg/ha
Rosas	<i>Thrips (Frankliniella occidentalis)</i>	0.75kg/ha
Cacao	<i>Pulgon de cacao (Toxoptera aurantii)</i>	0.12kg/ha

COMPATIBILIDAD

El producto es compatible con la mayoría de plaguicidas usados en la agricultura, no es compatible con productos ácidos, alcalinos y agentes oxidantes

TOXICIDAD

Categoría III - franja azul - LIGERAMENTE PELIGROSO



CUIDADO



PERÍODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada luego de 24 horas

PERÍODO DE CARENIA

No aplicar este producto durante los 14 días que preceden a la cosecha para arroz y 7 días para maíz. Con aplicaciones siempre dirigidas al follaje

REGISTRO

151- I2/NA

FABRICADO Y FORMULADO POR



NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.

IMPORTADO POR

